

Cos'è la colecistite alitiasica, i sintomi e le cure migliori

Salute e Benessere

Inviato da : Adriana Addy

Pubblicato il : 8/1/2024 8:30:00

La colecistite alitiasica è priva di calcoli, ma la sua infiammazione, chiamata colecistite alitiasica, è ben più grave di quella determinata da calcolosi. Vediamo i sintomi e le cure.

Con il termine di colecistite alitiasica, non indichiamo una patologia, semmai una condizione di normalità, ovvero l'assenza di calcoli all'interno di questo piccolo organo a forma di sacchetto.

La colecisti (o cistifellea), ha il compito di raccogliere la bile, una sostanza densa prodotta dal fegato, che serve per il metabolismo dei grassi di origine alimentare (ad esempio il colesterolo). Questo piccolo organo è soggetto alla formazione di calcoli, i quali, ostruendo i dotti biliari, possono provocare un'infiammazione, ovvero una colecistite.

A

Si tratta di un disturbo più comune di quanto non si creda, che si può curare con la dieta e una terapia ospedaliera si base di antibiotici e analgesici, soprattutto quando si manifesta sotto forma acuta. Tuttavia, questa infiammazione della cistifellea può verificarsi anche in assenza di calcoli, ed ecco perché parliamo di colecistite alitiasica. In genere si verifica in una percentuale bassa rispetto alla colecistite con calcoli, circa il 5-10% dei casi, ma è più seria rispetto all'altra. Le cause possono essere diverse, tra queste le più probabili sono:

■ Conseguenza di interventi chirurgici importanti

Infezioni sistemiche dell'organismo

■ Traumi addominali

Storici gravi

■ Diggiuno prolungato

Cos'è la colecistite alitiasica, i sintomi e le cure migliori

<http://www.dimensionenotizia.com/modules/news/article.php?storyid=11686>

- Nutrizione con le fiabe per mesi

- Defici immunitari

Anche se le cause sono diverse, la colecistite alitiasica si manifesta con gli stessi sintomi di quella provocata dai calcoli, ovvero:

Dolore forte e improvviso, quasi insopportabile, al quadrante superiore destro dell'addome con riflesso alla schiena (zona sotto la scapola destra)

Dolore prolungato, che si mantiene costante per almeno sei ore

Febbre (oltre i 38°C)

- Nausea e vomito

- Brividi

Addome disteso e duro

Questa forma di colecistite va trattata subito, perché può provocare anche la caricena o l'iperforazione dell'organo e, di conseguenza, anche la morte. Una volta arrivati alla diagnosi di colecistite alitiasica attraverso l'ecografia, l'unica cura possibile è l'intervento chirurgico per la rimozione dell'organo. Se eseguito subito, permette al paziente di riprendersi presto. La colecisti non è un organo vitale, la sua rimozione consente comunque una vita assolutamente normale.

A